

子どもの定期予防接種一覧表

予防接種の種類		接種回数	接種間隔	接種対象年齢	標準的接種年齢
ロタウイルス感染症		※ワクチンの種類で異なります。 ロタリックス: 2回 ロタテック: 3回	ロタリックス 2回目: 27日以上 ロタテック 2回目: 27日以上 3回目: 2回目から27日以上	ロタリックス 生後6週から生後24週までの者 ロタテック 生後6週から生後32週までの者	初回接種は生後2カ月から出生14週6日後まで
B型肝炎		初回: 2回 追加: 1回	27日以上 1回目の接種から139日以上	1歳に至るまでの者	生後2カ月から9カ月に至るまで
ヒブ感染症(Hib)	生後2～6カ月で開始	初回: 3回 追加: 1回	27日以上 初回終了後7カ月以上	生後2カ月から5歳に至るまでの者 ※接種開始時期により接種回数が異なります	初回接種は生後2カ月から7カ月に至るまでに開始
	生後7～11カ月で開始	初回: 2回	27日以上		
		追加: 1回	初回終了後7カ月以上		
	1歳以上で開始	1回	—		

小児の肺炎球菌感染症	生後2～6カ月で開始	初回:3回	27日以上	生後2カ月から5歳に至るまでの者 ※接種開始時期により接種回数異なります	初回接種は生後2カ月から7カ月に至るまでに開始 追加接種は初回接種終了後、1歳から1歳3カ月に至るまで
		追加:1回	初回終了後60日以上		
	生後7～11カ月で開始	初回:2回	27日以上		
		追加:1回	初回終了後60日以上		
	1歳で開始	2回	60日以上		
	2歳以上で開始	1回	—		
五種混合 ※1 (百日せき、ジフテリア、破傷風、ポリオ、ヒブ) または 四種混合 (百日せき、ジフテリア、破傷風、ポリオ) または 三種混合 (百日せき、ジフテリア、破傷風) または	1期	初回:3回	20日以上	生後2カ月から7歳6カ月に至るまでの者	生後2カ月から1歳に達するまでの者
追加:1回		1期初回(3回)終了後6カ月以上	生後2カ月から7歳6カ月に至るまでの者	1期初回(3回)終了後、1年～1年6カ月までの間隔をおいた者	
BCG(結核)		1回	—	1歳に至るまでの者	生後5カ月から生後8カ月に達するまでの者
麻しん(はしか)・風しん混合(MR)	1期	1回	—	1歳から2歳に至るまでの者	
	2期	1回	—	5歳・6歳で小学校就学前の1年間(4月1日～3月31日)	

水痘(水ぼうそう)		2回	3カ月以上	1歳から3歳に至るまでの者	1回目の接種は1歳から1歳3カ月に達するまで 2回目の接種は1回目の接種終了後6カ月から1年の間隔をおく
日本脳炎 ※2	1期	初回:2回 追加:1回	6日以上 1期初回(2回)終了後6カ月以上	生後6カ月から7歳6カ月に至るまでの者 生後6カ月から7歳7カ月に至るまでの者	3歳から4歳に達するまでの者 4歳から5歳に達するまでの者
	2期	1回	—	9歳以上13歳未満の者	小学4年生(学校配布)
二種混合 (ジフテリア、破傷風)	2期	1回	—	11歳以上13歳未満の者	小学6年生(学校配布)
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん) ※3		※ワクチンの種類、年齢で異なります サーバリックス:3回 ガーダシル:3回 シルガード 1回目の接種を15歳以上で受ける場合:3回 1回目の接種を15歳未満で受ける場合:2回	※ワクチンの種類で異なります サーバリックス 2回目:1カ月以上 3回目:初回接種から5カ月以上かつ2回目から2カ月半以上 ガーダシル 2回目:2カ月以上 3回目:1回目から6カ月以上 シルガード 1回目の接種を15歳以上で受ける場合 2回目:2カ月以上 3回目:1回目から6カ月以上 1回目の接種を15歳未満で受ける場合 2回目:6カ月以上 ※2回目が初回接種から5カ月未満であった場合、3回目の接種を実施する。	12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子	中学1年生(小学6年生に送付)

※1 四種混合またはHib感染症の予防接種を一度も受けたことがない方が対象です。

※2 平成7年4月2日～平成19年4月1日生まれの方は対象年齢(20歳未満の方)に特例があります。

※3 平成9年4月2日～平成20年4月1日生まれの方は令和7年3月31日まで特例があります。